

BONITA BLANCA

Solanum tuberosum ssp *andigena*

Al igual que el resto de las Bonitas es muy apreciada entre los consumidores por su sabor característico. en otras zonas de la isla se le conoce como Marrueca, Marroquina, Marrueca Blanca o Papa Boba. Está englobada como el resto de las Bonitas dentro de la subespecie *andigena*.

PLANTA

- Hábito planta: decumbente
Nº de tallos principales: medios (4-8)
Color del tallo: verde con pocas manchas
Altura de la planta en floración: corta (<75 cm)
Grado de floración: moderado
Madurez de follaje: intermedio-tardío (120 a 180 días)



HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: redondeado



Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico


Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 50°

FLOR

Color del pedicelo: pigmentado bajo la articulación

Color del cáliz: verde


Forma de la corola: pentagonal



Color predominante de la flor: morado

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: en ambos lados del acumen




Tamaño de la flor: pequeña (< 30 mm)

Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)

TUBÉRCULO

Forma: predominantemente redondo



Color piel: marrón, morado rojizo en ojos

Color carne: amarillo claro

Profundidad ojos: ligeramente profundos (2-4 mm)

Textura piel: intermedia

Nº ojos por tubérculo: muchos (> 10)

Color primario brotes: morado

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: en la base

