

MORISCO ROJO

Triticum aestivum ssp. *aestivum* var. *erythrospermum*


CBT00731

Municipio:-

Fecha recolección:-


PARTE VEGETATIVA

Hábito de crecimiento: semiprostrado
Pelos hoja: ausencia
Pelos aurícula: presencia
Pigmentación aurícula: débil
Serosidad vaina: fuerte
Serosidad raquis espiga: débil
Serosidad hoja: ausente o muy débil
Precocidad: tardío (111-120 días)
Nº de hijos: 4,58
Nº espigas/planta: 4,77
Altura planta (cm): muy alto (117,58)
Altura paja(cm): mediana (102,76)
Sección paja: 1/2 lleno




ESPIGA

Forma espiga: fusiforme




Longitud raquis (cm): 8,48
Longitud espiga (cm): 9,79
Ancho cara/perfil espiga (mm): 7,99/10,06
Densidad espiga: muy suelta
Nº espiguillas: 13,46
Longitud/ancho espiguilla (mm): 14,64/13,05
Abertura espiguilla : flaveliforme
Longitud barbas o aristas (cm): aristada (7,03)
Color barbas o aristas: blanca
Divergencia: divergente
Nº granos/espiguilla: 2,93
Color gluma: blanca
Longitud gluma (mm): mediana (8,90)
Forma gluma: alargada
Longitud diente apical (mm): largo (6,66)
Forma diente apical: ligeramente curvado




Ancho hombro (mm): estrecho (0,56)

Forma hombro: redondeado



Pilosidad externa: ausente
Pilosidad interna: nula o muy escasa



GRANO

Nº granos/espiga: 39,85
Longitud del grano (mm) semilargo (7,19)
Forma del grano: semialargado
Corte transversal: blanco
Color del grano: rojo
Peso de 1000 granos (g): 32,2

