

RAPOSO

Triticum aestivum ssp. *compactum* var. *erinceum*


CBT00598

Municipio: Buenavista del Norte

Fecha recolección: 2004


PARTE VEGETATIVA

Hábito de crecimiento: intermedio
Pelos hoja: ausencia
Pelos aurícula: presencia
Pigmentación aurícula: fuerte
Serosidad vaina: muy fuerte
Serosidad raquis espiga: fuerte
Serosidad hoja: ausente o muy débil
Precocidad: muy tardío (> 120 días)
Nº de hijos: 4,5
Nº espigas/planta: 3,87
Altura planta (cm): muy alto (118,12)
Altura paja(cm): mediana (107,91)
Sección paja: hueco



ESPIGA

Forma espiga: bordes paparalelos




Longitud raquis (cm): 4,37
Longitud espiga (cm): 5,14
Ancho cara/perfil espiga (mm): 11,11/12,85
Densidad espiga: densa


Nº espiguillas: 15,95
Longitud/ancho espiguilla (mm): 12,61/10,51
Abertura espiguilla : flaveliforme
Longitud barbas o aristas (cm): aristada (5,84)
Color barbas o aristas: rojas a marrones
Divergencia: divergente
Nº granos/espiguilla: 2,89
Color gluma: roja a marrón
Longitud gluma (mm): mediana (7,98)
Forma gluma: alargada
Longitud diente apical (mm): largo (6,05)
Forma diente apical: ligeramente curvado



Ancho hombro (mm): estrecho (0,56)
Forma hombro: elevado



Pilosidad externa: ausente
Pilosidad interna: media



GRANO

Nº granos/espiga: 45,9
Longitud del grano (mm): semilargo (6,63)
Forma del grano: semialargado
Corte transversal: blanco
Color del grano: rojo
Peso de 1000 granos (g): 36,85

