

AZUCENA NEGRA

Solanum tuberosum ssp andigena

Muy apreciada por los consumidores, valorándose especialmente aquellas producidas en la zona del Palmar, en el Parque Rural de Teno y las zonas de las medianías del norte de Tenerife. El grupo de las Azucenas ha sido englobado dentro de la subsp *andigena*.


PLANTA

- Hábito planta: decumbente
Nº de tallos principales: medios (4-8)
Color del tallo: verde con pocas manchas
Altura de la planta en floración: mediano (75-100 cm)
Grado de floración: profuso
Madurez de follaje: intermedio-tardío (120 a 180 días)



HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: cordado



Forma del primer foliolo lateral: anchamente elíptico

Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: 50°




FLOR

Color del pedicelo: pigmentado bajo la articulación

Color del cáliz: predominantemente verde


Forma de la corola: pentagonal



Color predominante de la flor: morado oscuro

Color secundario de la flor: blanco

Distribución del color secundario de la flor: en ambos lados del acumen



Tamaño de la flor: pequeña (< 30 mm)


Pigmentación de las anteras: sin antocianinas

Exención del estigma: moderadamente exerto (2-5 mm)



TUBÉRCULO

Forma: predominantemente redondo



Color piel: morado salpicado de marrón

Color carne: crema

Profundidad ojos: superficiales (<2 mm)

Textura piel: áspera

Nº ojos por tubérculo: intermedios (8-10)

Color primario brotes: violeta

Color secundario brotes: blanco

Distribución del color secundario brotes: en pocas manchas a lo largo

